A.M.C.
CHEMICAL



FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

AMC BROTACION-L

AMINOACIDOS

Características

AMC BROTACION-L, es una formulación completa formada por aminoácidos, nitrógeno y sustancias naturales pro-oxidantes, especialmente indicadas para incrementar la capacidad del cultivo para interrumpir la dormancia y anticipar la brotación.
AMC BROTACION-L, proporciona precocidad y uniformidad en la brotación, evita la dominancia apical y mejora la calidad y homogeneidad de las producciones agrícolas, reduciendo a su vez el número de recolecciones.
AMC BROTACION-L, es un producto biocompatible, respetuoso con el medio ambiente y su manejo no supone ningún riesgo toxicológico para los operadores ni deja residuos en los cultivos tratados.

En su aplicación es necesaria su mezcla con el nutriente específico TENSICAL.

Riquezas garantizadas

Aminoácidos totales..... 7,5% m/m
Aminoácidos libres..... 6% m/m
Nitrógeno Orgánico..... 1,2% m/m
pH = 5 (± 0,5)
Densidad = 1,11 gr/cc

Procedencia de Aminoácidos: Producto enzimático de origen vegetal (maíz).
Clase B: Contenido en metales pesados inferior a los límites autorizados para esta clasificación.

Aminograma (gr aminoácidos libres / 100 gr muestra):
Ácido aspártico 0,32; Serina 0,28; Ácido glutámico 1,33; Glicina 0,78; Histidina 0,12; Arginina 0,32; Treonina 0,3; Alanina 0,4; Prolina 0,2; Tirosina 0,06; Valina 0,28; Metionina 0,005; Lisina 0,82; Isoleucina 0,47; Leucina 0,13; Fenilalanina 0,17; Triptófano 0,015.

Departamento Técnico Agrícola
Teléfonos:
Centralita: (34) 954 930 942
Pedidos: (34) 954 930 943
Administración: (34) 954 930 944
Exportación: (34) 954 930 945
Fax: (34) 954 930 899
info@amcchemical.com
www.amcchemical.com

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

Observaciones

S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.
S13 Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
S46 En caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

No aplicar con COBRES, aceites minerales ni con productos de fuerte reacción alcalina.

Dosis y modo de empleo

Dosis: 2 – 4% en todos los cultivos. Consultar con el Departamento Técnico Agrícola.

Modo de empleo: Aplicar siempre junto con la especialidad TENSICAL. Aplicar en uva de mesa en estadio fenológico C, y en el resto de cultivos en el estadio fenológico B.

Aplicar con un volumen de caldo suficiente para mojar completamente el cultivo y evitar días o vísperas de lluvia o viento. Aplicar preferentemente a primera hora de la mañana o al atardecer.

Garantías

A.M.C. CHEMICAL S.L., garantiza la composición del producto y la adecuación para los fines que se persiguen.
A.M.C. CHEMICAL S.L., nunca será responsable de los daños derivados por un uso incorrecto, almacenaje o manipulación indebida, etc…, que se hiciera del formulado, ya que escapan a su control.
En caso de duda, consultar con nuestro Departamento Técnico Agrícola.